

PROBIOMIX

60 cápsulas vegetales de 400 mg

Los fermentos lácticos son útiles para favorecer el equilibrio de la flora bacteriana intestinal.

INGREDIENTES: mezcla de fermentos lácticos vivos: Lactobacillus reuterii UBLRu-78 TM, Bifidobacterium Longum BL-05 TM, Lactobacillus acidophilus La-14TM , Lactobacillus rhamnosus Lr-32 TM, Lactobacillus salivarius Ls-33 TM, Lactobacillus plantarum Lp-115 TM; Inulina , Fructo-oligosacáridos , antiaglomerantes: celulosa microcristalina, magnesio estearato, Dióxido de silicio. Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa).

MODO DE USO: se aconseja tomar 2 cápsulas al día, por la mañana preferiblemente en ayunas, acompañadas de un vaso de agua no muy caliente.

COMPOSICIÓN

Nutriente	Dosis/Día (2 cps)
-----------	-------------------

Fermentos lácticos vivos de los que:	no menos de 3,3 mld UFC
Lactobacillus acidophilus La-14	no menos de $1,3 \times 10^9$ UFC
Lactobacillus reuterii UBLRu-78	no menos de $2,5 \times 10^8$ UFC
Lactobacillus rhamnosus Lr-32	no menos de $2,5 \times 10^8$ UFC
Lactobacillus plantarum Lp-115	no menos de 5×10^8 UFC
Lactobacillus salivarius Ls-33	no menos de 5×10^8 UFC
Bifidobacterium Longum BL-05	no menos de 5×10^8 UFC
Inulina	80 mg
Fructo-oligosacáridos	80 mg

INDICACIONES: La mezcla de fermentos lácticos favorece la recolonización de la microflora intestinal alterada (fenómeno de disbiosis) esta puede tener diferentes causas (fármacos, hormonas, antibióticos, infecciones, alteraciones de los enzimas pancreáticos y/o biliares, alimentación desequilibrada,...). Alteraciones digestivas en general. La inulina: fibra alimenticia soluble, alimento para la flora bacteriana láctica del colon favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta (láctico, acético y butírico) que ayudan a la reparación de las células del colon. La inulina favorece el crecimiento de los Bifidobacterium y permite a los fermentos lácticos una correcta implantación.

Protocolo anti cóndida: dos cápsulas al día junto con CANDIMIX (2 cpr/día) y/o CANDIDPLUS (2 cpr/día) durante dos meses, con dieta anticándida*.

Protocolo de las "4R" (Remover-Reinocular-Reparar-Reemplazar) REINOCULAR

*Dieta Anti-Cándida: Reducir la ingesta de pan, galletas, pasta, dulces, fruta fresca y fruta seca a 20-60 gramos de carbohidratos por día, ya que de este modo se debilita al hongo (Cándida) y se debilita su capacidad de reproducirse. Evitar: la miel, la melaza, los siropes, el azúcar, el chocolate, alcohol, gluten, y levaduras, vinagre (aumenta la acidez del tubo digestivo) los productos lácticos (a excepción del yogourt que favorece la eliminación de la cándida). Así se recomienda controlar las etiquetas de los productos alimenticios para evitar aquellos que contengan: Sacarosa, Maltosa, Glicógeno, Lactosa, Glucosa, Sorbitol y Manitol.

ADVERTENCIAS: No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de niños menores de tres años. Los complementos alimenticios no han de utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida sano. Puede contener trazas de casina (derivada de **leche**).

Esta información de base se restringe a personas cualificadas en medicina, alimentación y farmacia (Directiva CEE 89/398 con autorización D.L. N 111 del 27/01/92 art. 6 coma II).